

MEDICINOS DARBUOTOJAMS REKOMENDUOJAMŲ SKIEPŲ SĄRAŠAS**

Liga	Skiepų planas	Indikacijos	Pastabos
Virusinis hepatitas B	Trys dozės (0, 1, 6 mėn.). Galimos kitos gamintojų nurodytos schemos.	Darbuotojai, turintys kontaktą su krauju ir kitais kūno skysčiais.	Po 1-2 mėn. užbaigus vakcinaciją atliekamas anti-HBs tyrimas.
Gripas	Kiekvienais metais 1 dozė.	Medicinos darbuotojai turintys kontaktą su pacientais.	
Tymai (MMR vakcina)	1 dozė.	Medicinos darbuotojai anksčiau neskiepyti, nesirgę, neturintys specifinių antikūnų ar kurių imuninė būklė nežinoma.	Imlūs ligai asmenys (neturintys specifinio imuniteto).
Vėjaraupiai	2 dozės su ne mažesniu kaip 6 sav. intervalu.	Medicinos darbuotojai, kurie yra nesirgę, neskiepyti ar kuriems laboratoriniais tyrimais nenustatytas specifinis imunitetas.	Imlūs ligai asmenys (nesirgę, neskiepyti).
Stabligė Difterija	Pirminė vakcinacija neskiepytiems (3 dozės su ne mažesniu kaip 4 savaitių intervalu). Sustiprinanti dozė kas 10 m.	Medicinos darbuotojai turintys kontaktą su pacientais.	Susižeidus taikoma poekspozicinė stabligės imunoprofilaktika.

**** - Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V-716 „Dėl darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“.**